

IbuEvanol PLUS

RÁPIDA ACCIÓN
Ibuprofeno
Cafeína

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO. ¿QUÉ CONTIENE IBUEVANOL PLUS RÁPIDA ACCIÓN?
FÓRMULA: Cada cápsula de gelatina contiene: Ibuprofeno 200 mg; Cafeína 50 mg. **Ingredientes inactivos:** Polihidroxietilenglicol 600, Hidróxido de potasio al 43 % p/p; Gelatina; Anhidrisorb 85/70; Metilparabeno; Propilparabeno; Dióxido de titanio; FD&C Rojo # 40; FD&C Azul # 1.
ACCIONES: Ibuprofeno: Analgésico (Calma el dolor) – Antifibril (Baja la fiebre) – Antiinflamatorio (reduce la inflamación). ¿PARA QUE SE USA IBUEVANOL PLUS RÁPIDA ACCIÓN? Está indicado para el alivio sintomático de dolores (menstruales, de espalda, de cabeza, musculares, articulares, de dientes), dolores asociados a estados gripales y para bajar la fiebre. **¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?** Vía de administración oral. Adultos y mayores de 15 años: 1 o 2 cápsulas cada 6 – 8 horas preferentemente con o después de las comidas. Las cápsulas deben ser tomadas con agua. Mientras los síntomas persistan, el intervalo mínimo entre dosis puede ser de 6 horas, sin exceder la dosis máxima de 6 cápsulas de 200 mg de ibuprofeno/50 mg de cafeína (1200 mg de ibuprofeno/ 300 mg de Cafeína / día). No tome más que la dosis establecida. No debe ser usado junto con otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios. No tomar por más de 5 días para el alivio del dolor o de 3 días para la fiebre. Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48 horas, consulte con su médico. No usar en niños menores a 15 años. **¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ESTE MEDICAMENTO?** No use este medicamento si: Es alérgico al ibuprofeno, aspirina, a otros medicamentos similares conocidos como antiinflamatorios, a la cafeína o a otros ingredientes de la fórmula. Tiene o ha tenido úlcera en el estómago, perforación o sangrado del estómago. Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios, incluyendo medicamentos conocidos como inhibidores de la COX-2. Padece alguna enfermedad del hígado, riñones o corazón.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? Debe ser tomada la menor dosis de este producto por el período de tiempo más corto necesario para aliviar sus síntomas. Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si: Es mayor de 65 años. Tiene: asma o enfermedades alérgicas; presión arterial alta o ciertos problemas circulatorios; problemas de estómago o ha tenido recientemente una cirugía de estómago o padece problemas intestinales como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Padece alguna enfermedad del colágeno autoinmune como enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus eritematoso sistémico o dermatomiositis. Si usted recibe algún otro medicamento, o está intentando quedar embarazada, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Este producto contiene metilparabeno y propilparabeno que pueden causar reacciones alérgicas (posiblemente tardías). **¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?** Este medicamento contiene cafeína. Evite tomar bebidas en exceso que contienen cafeína (por ej., té, café, bebidas enlatadas que contienen cafeína) cuando toma este medicamento. Tomar cafeína en exceso puede resultar en dificultad para dormir, temblores y molestias en el pecho causadas por palpitaciones. Suspenda su uso y consulte con su médico inmediatamente si Usted: Presenta alergias como erupción en la piel y picazón, que a veces puede acompañarse de problemas respiratorios o hinchazón de los labios, lengua, garganta o cara; erupción en la piel o descamación, o úlceras en la boca; empeoramiento de su asma; moretones o sangrado inusual, fiebre, dolor de garganta, úlceras en la boca, palidez extrema o debilidad; problemas de hígado incluyendo ictericia (los síntomas pueden incluir coloración amarillenta en piel y blanco de los ojos). Desarrolla úlcera en el estómago, vomita sangre o arena roja marrón (como borra de café) o tiene materia fecal negra. Empeora una enfermedad intestinal preexistente como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. **¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS. O SI TOMO MÁS CANTIDAD DE LA RECOMENDADA?** Llame a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6866 / 2247, Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6548 / 4658-7777, Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel.: (0221) 451-5555.

IBUEVANOL PLUS RÁPIDA ACCIÓN.

Ibuprofeno, Cafeína.

CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 30°C. MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. NO USAR SI LA LÁMINA QUE PROTEGE A LAS CÁPSULAS NO ESTÁ INTACTA. ESTE MEDICAMENTO ES LIBRE DE GLUTEN.



75x25x97



DOLORES MENSTRUALES - ANALGÉSICO Y
ANTIINFLAMATORIO

gsk

IbuEvanol PLUS

RÁPIDA ACCIÓN

Ibuprofeno Cafeína

20 CÁPSULAS | VENTA
BLANDAS | LIBRE

IbuEvanol PLUS

RÁPIDA ACCIÓN
Ibuprofeno
Cafeína

¿TIENE UD. ALGUNA CONSULTA? Llame al 0-800-888-6006 ó escribanos a infomedica.consumo@gsk.com - www.ibeuvanol.com.ar - ANMAT Responde. 0800-333-1234.
Elaborado en: Avenida Márquez 691, (B1657CSA) Loma Hermosa, Buenos

Aires, Acondicionado en: GlaxoSmithKline Argentina S.A., Carlos Casares 3690, (B1644BCD) Victoria, Buenos Aires, Argentina. Director Técnico: Eduardo D. Camino - Farmacéutico. Especialidad Médica Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 51.165.
Fecha última revisión: Marzo 2018. INDUSTRIA ARGENTINA.

0-800-888-6006
infomedica.consumo@gsk.com
www.ibeuvanol.com.ar

6256800509

Si este medicamento le resulta eficaz, Favor de avisar al fabricante o a su casa de venta, comunicarse con el ANMAT mediante formulario de notificación on-line disponible en <http://www.anmat.gov.ar/informacion/guia/guia-notificacion.asp>. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por GSK © 2015 GSK o licenciataria.

IbuEvanol PLUS

RÁPIDA ACCIÓN
Ibuprofeno
Cafeína