

IBUEVANOL MAX RÁPIDA ACCIÓN
IBUPROFENO 400 mg, CAFEÍNA 100 mg.
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL
MEDICAMENTO. ¿QUÉ CONTIENE IBUEVANOL MAX RÁPIDA
ACCIÓN? FÓRMULA: Cada cápsula blanda de gelatina contiene:
 Ibuprofeno 400 mg; Cafeína 100 mg. Excipientes: Polietilenglicol 600;
 Hidróxido de potasio al 43 %; Gelatina; Anhidrisorb 85/70;
 Metilparabeno; Propilparabeno; FD&C Rojo N° 40; Dióxido de titanio
 suspendido en Anhidrisorb. **ACCIONES:** Ibuprofeno: Analgésico
 (Calma el dolor) – Antifebril (Baja la fiebre) – Antiinflamatorio
 (reduce la inflamación). Cafeína: adyuvante del efecto analgésico
 (la cafeína potencia el efecto analgésico del ibuprofeno). **¿PARA QUÉ**
SE USA IBUEVANOL MAX RÁPIDA ACCIÓN? Está indicado para el
 alivio sintomático de dolores (menstruales, de espalda, musculares,
 articulares, de dientes, de cabeza), migraña, dolores asociados a
 estados gripales y para bajar la fiebre. **¿CÓMO SE USA ESTE**
MEDICAMENTO? Vía de administración oral. Adultos y mayores de
 15 años: 1 cápsula cada 6 - 8 horas preferentemente con o después
 de las comidas. Las cápsulas deben ser tomadas con agua. Mientras
 los síntomas persistan, el intervalo mínimo entre dosis puede ser de
 6 horas, sin exceder la dosis máxima de 3 cápsulas de 400 mg de
 ibuprofeno/100 mg de cafeína (1200 mg de ibuprofeno/ 300 mg de
 Cafeína / día). No tome más que la dosis establecida. No debe ser
 usado junto con otros productos conteniendo ibuprofeno u otros
 antiinflamatorios. No tomar por más de 5 días para el alivio del dolor
 o de 3 días para la fiebre. Si los síntomas persisten o empeoran por
 más de 48 horas, consulte con su médico. No usar en niños menores
 de 15 años. **¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ESTE**
MEDICAMENTO? No use este medicamento si: •Es alérgico al
 ibuprofeno, aspirina, a otros medicamentos similares conocidos como
 antiinflamatorios, a la cafeína o a otros ingredientes de la fórmula.
 •Tiene o ha tenido úlcera en el estómago, perforación o sangrado del
 estómago. •Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u
 otros antiinflamatorios, incluyendo medicamentos conocidos como

inhibidores de la COX-2. •Padece alguna enfermedad del hígado,
 riñones o corazón. **¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR**
ESTE MEDICAMENTO? Debe ser tomada la menor dosis de este
 producto por el período de tiempo más corto necesario para aliviar
 sus síntomas. Tenga especial precaución y consulte con su médico
 antes de tomar este medicamento si: •Es mayor de 65 años. •Tiene:
 asma o enfermedades alérgicas; presión arterial alta o ciertos
 problemas circulatorios; problemas de estómago o ha tenido
 recientemente una cirugía de estómago o padece problemas
 intestinales como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. •Si usted
 recibe algún otro medicamento, o está intentando quedar
 embarazada, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte
 a su médico antes de tomar este medicamento. •Si usted padece
 alguna enfermedad del colágeno autoinmune como enfermedad
 mixta del tejido conectivo, lupus eritematoso sistémico
 o dermatomiositis.

Este producto contiene metilparabeno y propilparabeno que pueden
 causar reacciones alérgicas (posiblemente tardías).

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE
MEDICAMENTO? Este medicamento contiene cafeína. Evite tomar
 bebidas que contienen cafeína (por ej., té, café, bebidas enlatadas
 que contienen cafeína) cuando toma este medicamento. Tomar
 cafeína en exceso puede resultar en dificultad para dormir, temblores
 y molestias en el pecho causadas por palpitaciones. Suspenda su uso
 y consulte con su médico inmediatamente si Usted: •Presenta
 alergias como erupción en la piel y picazón, que a veces puede
 acompañarse de problemas respiratorios o hinchazón de los labios,
 lengua, garganta o cara; erupción en la piel o descamación, o úlceras
 en la boca; empeoramiento de su asma; moretones o sangrado
 inusual; fiebre, dolor de garganta, úlceras en la boca, palidez extrema
 o debilidad; problemas de hígado incluyendo ictericia (los síntomas
 pueden incluir coloración amarillenta en piel y blanco de los ojos).
 •Desarrolla úlcera en el estómago, vómita sangre o arenilla marrón
 (como borra de café) o tiene materia fecal negra.

IBUEVANOL MAX RÁPIDA ACCIÓN IBUPROFENO 400 mg, CAFEÍNA 100 mg. ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA
SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA? Llame a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar
 más cercano de asistencia médica. Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666 / 2247. Hospital
 Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777. Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel.: (0221) 451-5555.
CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 30 °C. MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

7525897



¿TIENE UD. ALGUNA CONSULTA? Llame al 0-800-888-6006 o escribanos a
 info@medica.comsumo@gsk.com www.ibuevanol.com.ar ANMAT Responde: 0800-333-1234.
 Elaborado en: Avenida Marquex 691, (B1657CSA) Loma Hermosa, Buenos Aires.
 Accondicionado en: GlaxoSmithKline Argentina S.A., Carlos Casares 3690, (B1614BDD)
 Victoria, Buenos Aires, Argentina. Dir. Tec.: Eduardo D. Camino – Farmacéutico. Esp. Med.
 autorizada por el M. S. Cert. N° 54051. Fecha de última revisión: Abril 2019.
 Marcas registradas son propiedad o licenciadas por GSK. © 2019 GSK o licenciantes.
INDUSTRIA ARGENTINA.

ANALGÉSICO Y ANTIINFLAMATORIO 

IbuEvanol

MAX

RÁPIDA ACCIÓN

Ibuprofeno 400 mg
 Cafeína 100 mg

20 CÁPSULAS BLANDAS | VENTA LIBRE

IBUEVANOL MAX RÁPIDA ACCIÓN IBUPROFENO 400 mg,
CAFEÍNA 100 mg. NO USAR SI LA LÁMINA QUE PROTEGE
A LAS CÁPSULAS NO ESTÁ INTACTA. Si este medicamento
 le produjo algún **EFFECTO ADVERSO/INDESEADO** o **NO**
CAUSÓ EFFECTO, comuníquese con el ANMAT mediante
 el Formulario de Notificación on-line disponible en
<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>.
ESTE MEDICAMENTO ES LIBRE DE GLUTEN.



7 794640 172601 >

6258606301