IBUEVANOL RÁPIDA ACCIÓN Ibuprofeno
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL
MEDICAMENTO. JOUE CONTIENE IBUEVANOL RÁPIDA ACCIÓN?
FORMULA: Cada cápsula contiene: Ingrediente activo: Ibuprofeno
200,00 mg. Ingredientes inactivos: Polietilenglicol 600; Hidroxido
de potasio al 43%. Gelatina: Metiplarabeno; Propiliparabeno;
Anhidrisorò 85/70; FD&C Verde #3, ACCIONES: Analgésico Calma
di dolor) - Antiberil (baja la fiebre) - Antifinamatorio (reduce la
inflamación), JPARA QUE SE USA? Este medicamento está
indicado para el alivio sintomático de dolores (menstruales de
espalda, de cabeza, musculares, de dientes), dolores asociados a
estados graples y para bajar la fiebre. 200m SE USA ESTE
MEDICAMENTO? Solo para administración oral. Adultos y mayores
de 12 años: 1-2 cápsulas cada 8 horas, Mientras los sintomas
persistan, el intervalo mínimo entre dosis puede ser de 4 horas,
sin exceder la dosis máxima de 6 cápsulas de 200 mg
(1200 mg/día). Tomar preferentemente con agua después de las
comidas. No tomar por más de 5 días para el dolor o 3 para le
iebre. No tomar más de la dosis indicada. Si los sintomas
persisten o empeoran por más de 48/72 hs consulte con su
médico. No usar en niños menores de 12 años. 200º PERSONAS
NO PUEDEN RECIBIR ESTE MEDICAMENTO? No use este
medicamento sis •Es alergico al ibuprofeno, aspirina, a otros
antiinflamantorios conocidos como antiinflamantorios similares, a otros medicamentos
antiinflamantorios conocidos como antiinflamantorios sono conocidos como antiinflamantorios sono conocidos como antiinflamantorios
sono actor singedientes del producto. •Tene o ha tenido
ulcera en el estómago, perforación o sangrado del estómago.
•Padece de falla hepática o renal o de falla cadaca severa.
-Está en los últimos 3 meses de embarzo. 200º CUIDADOS
DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? Siempre
me a menor dosis efectivos por el período de tiempo más corto
necesario para alvirár sus sintomass El buprofeno puede reducir
sistintos de una infección (no per dodor de debe de tenego más corto
necesari

tratamiento y consultar con un médico frente a la primera aparición de erupción cutánea, hendáse na la mucosa, o cualquier roto signo de hipersensibilidad, Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si. Es mayor de 65 años. • Está tomando otros antiniflamatorios o medicamentos antiniflamatorios problemas cheriado recientemente una cirugía de estómago, problemas intestinales como coltis ulcerosa o enfermedad de Crohn, o padece una entermedad mixta del tejido conectivo como por ejemplo lupus entrematosos sistemico. Consulter con su medico antes de tomar este medicamento, si Ud.; recibe algún otro medicamento; está intentando quedar embarazada, está embarazada o dando el pecho a su bebé; si Ud. está biomando en particular alguno de los siguentes medicamentos, usados para prevenir la coagulación de la sangre como anticoagulantes o antiplaquetarios; usados para tratar afectos entrosteroides (usados para antiviar la inflamación), ciclosporina; diuréticos para aumentar la producción urinaria y reducir el exceso de liquidos. Sulfonilizeas para tratar diebetes; litto e inhibidores selectivos de la recapitación de servición urinaria y reducir el exceso de liquidos. Sulfonilizeas para tratar delivetes; litto e inhibidores selectivos de la recapitación de socionina para tratar a depunso tipos de concer, artirito porsiass; zidovudina para tratar a el producción urinaria y reducir el exceso de liquidos. Sulfonilizeas para tratar delivetes; litto e inhibidores selectivos de la recapitación de porta para tratar a desensión urinaria y reducir el exceso de liquidos. Sulfonilizeas para tratar deliventos; sulfonilizeas portas continidado no forma regular ya sea de venta libre o con receta. Contine 35.84 m gel potasio por cápsula a ser considerado por las personas c

Si Ud. consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte con su médico antes de tomar este medicamento. ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TEMER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO? Suspenda su uso y consulte con su médico immediatamente si Ud.: • Presenta: alergias como erupción en la piel y picazión, que pueden acompañarse algunas veces de problemas respiratorios o hinchazón de los labios, lengue, garganta o cara; erupción en la piel o descamación: úberas en la boca; emperamiento de su sama; moretones o sangrado inusual, fiebre, dolor de garganta, paldez extrema o debilidad; problemas de higado incluyendo ictericia (los sintomas pueden incluir coloración mamillenta en pel y en el blanco de los ologs), dolor en el pecho, diadd repentina en una parte o en un lado del cuerpo o una repertina dificultad para hablar, dolor estomacal, náuseas, vómitos, flatulencia, diarrea o indigestión; • Desarrolla úlorar en el estomago, vomita sangre o o arenilla marrón (como borra de café) o tiene materia fecal negra. • Empeora una enfermedad intestinal preexistente como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.





IBUEVANOL RÁPIDA ACCIÓN Ibuprofeno. ¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA? Llame al JO-801-888-6006 o escribanos a informedica.consumo@gsk.com -www.buevanol.com.ar-ANMAI Responde. 0800-333-1234. Elaborado en Av. Márquez 631, Loma Hermosa, Bs. As. Acondicionado por GlaxoSmithKline Argentina S.A., C. Casares 3690, Victoria, Bs. As. Agentina. Dir, Téc.; Eduardo D. Camono - Farnaceutico. Esp. Med. autorizada por el M. S. Cert. Aggentina. Dir, Téc.; Eduardo D. Camono - Farnaceutico. Esp. Med. autorizada por el M. S. Cert. Nº 38.955. Fecha última revisión: Enero 2019. Marcas registradas son propiedad o licenciadas

IBUEVANOL RÁPIDA ACCIÓN Ibuprofeno 2016 DESO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS. O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NEETSARIA? Llame a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más corcano de assistencia médica. Hospital de Pediatria Ricardo Guiteirez. Tel. 2011 462-5666 / 2247. Hospital di R. A. Posadas Tel. 2011 465-5648 / 4658-5777. Centro de Assistencia locusogogo al Patra-le 1022/1 515-555. CONSERVAR A TEMPERATURA INFERIOR A 25°C. MARITERER FUERA DEL ACANCEY VISTA DELO SINIGO. ANTE COLABOURDO DO CONSULTE CON SU MÉDICO YO FARMACEUTICO. ESTE MEDICAMENTO ES LIBRE DE GLUTEN.



